



Condón femenino de segunda generación llegaría a Centroamérica

- *Costa Rica aún no cuenta con legislación ni proveedores registrados para la comercialización del condón, lo que impide su distribución en los servicios de salud públicos y privados, y locales comerciales.*

Con la misma calidad y a un precio más accesible el condón femenino de segunda generación incursionará en Centroamérica. Su lanzamiento oficial para la región se dio este jueves 4 de marzo, durante el segundo día del VI Congreso Centroamericano de ITS/VIH/sida –que reúne en Costa Rica a investigadores, científicos, jefes de salud y personas con el virus--.

“La relación hombre-mujer de la epidemia del VIH/sida en los inicios era de 20 hombres infectados por cada mujer infectada. Hoy las mujeres representan casi la mitad de los casos reportados. El condón femenino es el único método que permite a las mujeres tener el control para protegerse y prevenir la infección con el virus”, manifestó Marcela Suazo, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).



El condón femenino de segunda generación o FC2 está hecho de polímero de nitrilo, un material muy similar al de su antecesor (FC1), pero con la ventaja de tener un precio más accesible, conservando la calidad.

“La inequidad de género pone en mayor riesgo a las mujeres jóvenes para ejercer sus derechos sexuales, que contempla el goce de otros derechos, como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad, entre otros. El condón femenino no sólo las protege, sino que les devuelve el poder sobre su sexualidad”, manifestó Yolanda Delgado, directora técnica del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

La situación del condón femenino en Costa Rica

Si bien el lanzamiento oficial del condón femenino FC2 en Centroamérica abre las puertas para su introducción en el mercado costarricense, el momento exacto en el cual las mujeres podrán adquirirlo aún es incierto.

En Costa Rica, existe un proyecto de ley sobre derechos en salud sexual y reproductiva que busca que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) incluyan el condón femenino en sus programas de prevención de embarazos no planeados e ITS/VIH/Sida. Sin embargo, aún no ha sido aprobado.

Pero a la falta de un marco legal para su acceso en los centros médicos públicos, se suma la carencia de un proveedor registrado para su distribución, lo que frena por completo la factibilidad de su adquisición, tanto a nivel público como privado.

“Estamos trabajando para buscar una alianza entre algún distribuidor local y los fabricantes, para así poder contar con el condón femenino en el mercado costarricense”, afirmó Simone Martin, del Programa Support Female Condom, para América Latina y el Caribe.



Simone Martins, de Support, Marcela Suazo del UNFPA, Yolanda Delgado del INAMU y Adrián Vieto del Ministerio de Salud (en el orden usual) en la conferencia de prensa sobre el condón femenino.

El médico Adrián Vieto, representante del Ministerio de Salud, recalcó la importancia de trabajar en conjunto el tema de distribución y sensibilización. “El problema no se resuelve con tener la autorización para su venta, si no logramos que tenga un impacto real, si no logramos informar y sensibilizar sobre la necesidad de su uso”, afirmó.

El espacio dedicado al condón femenino en el marco de Concasida fue organizado por CIPAC, (ONG que ha promovido la incorporación de este método preventivo en el país) y el UNFPA, y contó con el apoyo del INAMU y Support. Hubo un conversatorio y talleres, donde gran cantidad de personas pudieron conocer su uso y experiencias exitosas de este método anticonceptivo en otros países de Latinoamérica. Actualmente el condón femenino se distribuye únicamente en Brasil y se realizan esfuerzos para su pronta incorporación en Perú, Ecuador y Jamaica.

Mujeres son cada vez más vulnerables

La desinformación, el poco acceso a servicios especializados, la dependencia económica, la explotación sexual y el machismo son factores que inciden en la feminización del VIH.

De manera general, las mujeres entre 15 y 24 años tienen probabilidades 1,6 veces mayores que los varones de la misma edad de portar VIH, de acuerdo con el informe La Feminización del VIH 2005, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

Las mujeres son más susceptibles que los hombres a la infección debido a factores sociales, culturales y fisiológicos. El riesgo de contraer VIH en una relación sexual vaginal no protegida es de 2 a 4 veces más alto para la mujer que para el hombre, pues el semen contiene una concentración mayor del virus que las secreciones vaginales.

En el aspecto social y cultural, las mujeres que dependen económicamente de su pareja no tienen acceso libremente a los preservativos y, la mayoría del tiempo, tampoco controlan el cómo y el cuándo de sus relaciones sexuales. Más de cuatro quintas partes de las nuevas infecciones de mujeres con VIH ocurren dentro del matrimonio o en relaciones de pareja de larga duración, según el informe de UNFPA.

Además, suelen carecer de poder de negociación y de apoyo social para insistir en condiciones de mayor seguridad, a lo que se suma la vulnerabilidad de ser víctimas de violación o de tener que prestar servicios sexuales, producto de la pobreza.



La actividad sirvió para mostrar a los participantes el uso del condón femenino.